

DOMINÓ

PRODUCTOS MICROBIOLÓGICOS

PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA

Inoculación de hongos micorrízicos

PERMITIDO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Grupos de microorganismos y probióticos efectivos:

- Streptomyces griseus spp
- Bacilo V. S. A. Spp
- Rhodobacter spp

MICROORGANISMOS QUE CON SU ACCIÓN NUTRICIONAL AYUDAN A LA PLANTA A SUPERAR EL ESTRÉS AMBIENTAL Y PATÓGENO

<u>Dónde</u>	<u>Aplicación</u>
BATERÍAS: ERWINIA, PSEUDOMONAS, XANTOMONAS, PSA, VERIDIFLAVA, VARIE	Foliar y radical
FUSARIUM OXISPORIUM E TRATAMIENTOS CON NEVADA	Foliar y radical

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

Kiwi: 2,5 kg/ha en primavera, repetir en floración

Arboree:(Porujo, drupácea, Agrumi) a 2-2,5 kg/ha.

Hortícola: 2,5-3 kg/ha

Hortalizas de hoja: 2,5-3 kg/ha

Olivo: 2-2,5 kg/ha

MISCIBILIDAD

Se puede mezclar con todos los fertilizantes de fertirrigación y foliares

No tratar con temperaturas inferiores a 10° C.

EXCLUIDOS:

TODOS TIPO DE COBRE, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS

Conf de 1-5 kg




Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 30

MICROORGANISMI VIVI

DOMINÓ

MICROORGANISMOS



Tratamientos foliares para superar el estrés en periodos críticos por bacteriosis en pre y post (Floración). Repita la intervención cada vez que se creen "heridas" en la planta: granizo, poda, floración, caída de hojas, aclareo, cosecha, etc.

Fruta de pepita y de hueso: Tratamientos a caballo entre las flores para bloquear la migración bacteriana.

Hortícola: se puede aplicar desde las primeras etapas de desarrollo de la planta, es recomendable repetir el tratamiento

Kiwi: los tratamientos se aplican en el despertar vegetativo, en floración y antes del desprendimiento, o en el caso de podas verdes o granizadas.

Olivo: es recomendable hacer un par de intervenciones al año donde surjan problemas

Mezclado con LECITINA es más eficaz por vía foliar, combinado con STIM BLACK por raíz

Notas:

Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 31

MICROORGANISMI VIVI