

KAPPA-O

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

FILTRADO DE ALGAS PERMITIDO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Matriz vegetal orgánica:

- Polisacáridos
- Extractos de plantas

LOS EXTRACTOS DE PLANTAS EN COMBINACIÓN CON DIVERSAS VITAMINAS, ASÍ COMO TIENE UNA ACCIÓN NUTRICIONAL, DESARROLLA UN ANTAGONISMO NATURAL HACIA LOS INSECTOS NO DESEADOS

Dónde	Aplicación
CHINCHES, FRANKINELLA, PULGONES, COCHINILLAS, POLILLAS, MELIGETES	Foliar
DROSOPHILA, MONO, LEMA, ARAÑA, MELOLONTA MELOLONTA	Foliar

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

VIÑEDO	350 gr/hl	500-600 lt agua/ha
Drupachi/Pomchi:	300-350 gr/hl	700-800 lt agua/ha
HORTÍCOLA:	300-350 gr/hl	500-700 lt agua/ha
Horticultura de invernadero	300 gr/hl	100 lt de agua/ 1000 m²
CEREALES:	350-400 gr/hl	300-400 lt agua/ha
Pomodoro en.	350 gr/hl	500 lt agua/ha
Cítricos	350 gr/hl	700-800 lt agua/ha

COMBINAR SIEMPRE CON 1 KG DE COLQUICK

MISCIBILIDAD

Se pueden mezclar con productos SpecialAgri o con insecticidas sintéticos

EXCLUIDOS:

CÚPRICOS, AZUFRES, CAPTANO, ACEITES SINTÉTICOS

Conf de 1-5 kg




Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 40

MICROORGANISMI VIVI

KAPPA-O

BIOTECNOLOGÍA

AZIONE KAPPA-O



Horticultura: Se debe aplicar en presencia del insecto a 300 g por 100 lt de agua (NO A DOSIS POR HECTÁREA). Se recomienda aplicar 30 días después del trasplante (por ejemplo, Citriol y Calabacín).

Fruto y Vid: Se debe aplicar en presencia del insecto a 300-350 gr por 100 lt de agua (NO A DOSIS POR HECTÁREA). Se recomienda aplicar a partir de los 20 días de floración

Cereales: Se debe aplicar en presencia del insecto a 300-350 g por 100 lt de agua (NO A DOSIS POR HECTÁREA).

COMBINAR SIEMPRE CON 1 KG DE COLQUICK

Notas:

Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 41

MICROORGANISMI VIVI