

PONEM

PRODUCTOS MICROBIOLÓGICOS

PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA Inoculación de hongos micorrízicos PERMITIDO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Grupos de microorganismos eficaces con acción quitinolítica más que familias:

- Pochonia Chlamydosporia spp
- Paecilomyces lilacinus Spp
- Nuevas variedades de hongos

MICROORGANISMOS QUE CON SU ACCIÓN NUTRICIONAL AYUDAN A LA PLANTA A SUPERAR EL ESTRÉS AMBIENTAL Y PATÓGENO

<u>Dónde</u>	<u>Aplicación</u>
ACCIÓN MICORRÍZICA, ESTIMULACIÓN RADICAL	Radical
NEMATODOS	Radical

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

VIÑA: 3-5 kg/ha inyectar a lo largo de la hilera y regar hasta que el producto entre en contacto con las raíces. Repetir el tratamiento a los 15/20 días

Hortícolas, invernaderos y cultivos a campo abierto: 4-5 kg/ha

Realizar el tratamiento antes de trasplantar/sembrar y repetir a los 15/20 días

Cultivos arbóreos: inyectar 5 kg/ha a lo largo de la hilera y regar hasta que el producto entre en contacto con las raíces. Repetir el tratamiento a los 15/20 días

VIVERISTAS: de 2-4 kg/ha;

MISCIBILIDAD

Se recomienda tratar solo con la adición de BIOFYT STAR (evitar combinaciones con fertilizantes que contengan fósforo)

EXCLUIDOS:

TODO TIPO DE COBRE, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.

Conf de 1-5 kg




Actividades de control biológico; Bioestimulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 60

MICROORGANISMI VIVI

PONEM

MICROORGANISMOS

AZIONE PONEM



Horticultura: Se debe aplicar en el trasplante a 4-5 kg/ha combinado con 25 kg de BIOFYT STAR con acción preventiva y de limpieza de superficies. En suelos con problemas de Nematodos, se recomienda aplicar 20 días de tratamientos a 3,5/4 kg/ha con 15/20 kg/ha de BIOFYT STAR, hasta el final del ciclo de producción.

Frutales y Viñas: se debe aplicar al inicio del ciclo vegetativo a 5/6 kg/ha combinado con BIOFYT STAR a 25 kg/ha, si es necesario se aplica un paso adicional 30/40 días después de la primera intervención.

Notas:

Actividades de control biológico; Bioestimulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 61

MICROORGANISMI VIVI